

Introducción a la Lógica y la Computación

Mariana Badano Héctor Gramaglia
Pedro Sánchez Terraf Mauricio Tellechea
Guido Ivetta

FaMAF, 3 de noviembre de 2021



- 1** Lenguajes no regulares
 - Lema de bombeo (Pumping Lemma)
 - Aplicación del Lema
 - Juego de no regularidad

- 2** Lenguajes libres de contexto
 - Gramáticas libres de contexto
 - Gramática para expresiones aritméticas

Lema de bombeo (Pumping Lemma)

Teorema

L regular \implies existe $k \in \mathbb{N}$ tal que para toda cadena $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$ existen palabras β, γ, δ tales que

- $\alpha = \beta\gamma\delta$;
- $\gamma \neq \epsilon$;
- $|\beta\gamma| \leq k$; y
- para todo $n > 0$, $\beta\gamma^n\delta \in L$.

Lema de bombeo (Pumping Lemma)

Teorema

L regular \implies existe $k \in \mathbb{N}$ tal que para toda cadena $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$ existen palabras β, γ, δ tales que

- $\alpha = \beta\gamma\delta$;
- $\gamma \neq \epsilon$;
- $|\beta\gamma| \leq k$; y
- para todo $n > 0$, $\beta\gamma^n\delta \in L$.

Toda palabra larga de un lenguaje regular L tiene un prefijo corto con una parte “repetible” (sin salirse de L).

Lema de bombeo (Pumping Lemma)

Teorema

L regular \implies existe $k \in \mathbb{N}$ tal que para toda cadena $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$ existen palabras β, γ, δ tales que

- $\alpha = \beta\gamma\delta$;
- $\gamma \neq \epsilon$;
- $|\beta\gamma| \leq k$; y
- para todo $n > 0$, $\beta\gamma^n\delta \in L$.

Toda palabra larga de un lenguaje regular L tiene un prefijo corto con una parte “repetible” (sin salirse de L).


La longitud del prefijo se puede acotar viendo un autómata \mathbb{A} que acepte L (y entonces $k \leq |\mathbb{A}|$).

Ejemplo de validez del Lema de bombeo

Toda palabra larga de un lenguaje regular L tiene un prefijo corto con una parte “repetible” (sin salirse de L).


Ejemplo de validez del Lema de bombeo

Toda palabra larga de un lenguaje regular L tiene un prefijo corto con una parte “repetible” (sin salirse de L).



Ejemplo de validez del Lema de bombeo

Toda palabra larga de un lenguaje regular L tiene un prefijo corto con una parte “repetible” (sin salirse de L).




Ejercicio

¿Quién es $L(\mathbb{A})$?

Ejemplo de validez del Lema de bombeo

Toda palabra larga de un lenguaje regular L tiene un prefijo corto con una parte “repetible” (sin salirse de L).




Ejercicio

¿Quién es $L(\mathbb{A})$?

¡Encuesta!

Ejemplo de validez del Lema de bombeo

Toda palabra larga de un lenguaje regular L tiene un prefijo corto con una parte “repetible” (sin salirse de L).



Ejercicio


¿Quién es $L(\mathbb{A})$?

¡Encuesta!

$$L(\mathbb{A}) = \{\alpha \in \{0, 1\}^* : |\alpha|_0, |\alpha|_1 \text{ impares}\}$$

Ejemplo de validez del Lema de bombeo

Toda palabra larga de un lenguaje regular L tiene un prefijo corto con una parte “repetible” (sin salirse de L).



Ejercicio

¿Quién es $L(\mathbb{A})$?


¡Encuesta!

$$L(\mathbb{A}) = \{\alpha \in \{0, 1\}^* : |\alpha|_0, |\alpha|_1 \text{ impares}\}$$

$$pp \xrightarrow{0} pi \xrightarrow{1} ii \xrightarrow{1} pi \xrightarrow{1} ii$$

Ejemplo de validez del Lema de bombeo

Toda palabra larga de un lenguaje regular L tiene un prefijo corto con una parte “repetible” (sin salirse de L).



Ejercicio

¿Quién es $L(\mathbb{A})$?

¡Encuesta!


$$L(\mathbb{A}) = \{\alpha \in \{0, 1\}^* : |\alpha|_0, |\alpha|_1 \text{ impares}\}$$

$$pp \xrightarrow{0} pi \xrightarrow{1} ii \xrightarrow{1} pi \xrightarrow{1} ii$$

Se **repite** un estado.

Ejemplo de validez del Lema de bombeo

Toda palabra larga de un lenguaje regular L tiene un prefijo corto con una parte “repetible” (sin salirse de L).



Ejemplo más largo:

$$pp \xrightarrow{0} pi \xrightarrow{1} ii \xrightarrow{0} ip \xrightarrow{1} pp \xrightarrow{0} pi \xrightarrow{1} ii$$

Ejercicio

¿Quién es $L(\mathbb{A})$?

¡Encuesta!

$$L(\mathbb{A}) = \{\alpha \in \{0, 1\}^* : |\alpha|_0, |\alpha|_1 \text{ impares}\}$$

$$pp \xrightarrow{0} pi \xrightarrow{1} ii \xrightarrow{1} pi \xrightarrow{1} ii$$

Se **repite** un estado.



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba



Prueba del Lema de bombeo

Sea L regular. Tenemos que encontrar $k \in \mathbb{N}$ tal que:

Toda palabra $\alpha \in L$ larga ($\geq k$) tiene un prefijo $\beta\gamma$ corto ($\leq k$) con una parte ($\gamma \neq \epsilon$) “repetible” (sin salirse de L).

Prueba del Lema de bombeo

Sea L regular. Tenemos que encontrar $k \in \mathbb{N}$ tal que:

Toda palabra $\alpha \in L$ larga ($\geq k$) tiene un prefijo $\beta\gamma$ corto ($\leq k$) con una parte ($\gamma \neq \epsilon$) “repetible” (sin salirse de L).

Demostración.

Sea \mathbb{A} un DFA tal que $L(\mathbb{A}) = L$, y sea k la cantidad de estados de \mathbb{A} .

Prueba del Lema de bombeo

Sea L regular. Tenemos que encontrar $k \in \mathbb{N}$ tal que:

Toda palabra $\alpha \in L$ larga ($\geq k$) tiene un prefijo $\beta\gamma$ corto ($\leq k$) con una parte ($\gamma \neq \epsilon$) “repetible” (sin salirse de L).

Demostración.

Sea \mathbb{A} un DFA tal que $L(\mathbb{A}) = L$, y sea k la cantidad de estados de \mathbb{A} .

Si α es más larga que k y es aceptada por \mathbb{A} , al consumirse los primeros k símbolos se tiene que haber repetido algún estado. Sea q el primer estado que aparece dos veces.

Prueba del Lema de bombeo

Sea L regular. Tenemos que encontrar $k \in \mathbb{N}$ tal que:

Toda palabra $\alpha \in L$ larga ($\geq k$) tiene un prefijo $\beta\gamma$ corto ($\leq k$) con una parte ($\gamma \neq \epsilon$) “repetible” (sin salirse de L).

Demostración.

Sea \mathbb{A} un DFA tal que $L(\mathbb{A}) = L$, y sea k la cantidad de estados de \mathbb{A} .

Si α es más larga que k y es aceptada por \mathbb{A} , al consumirse los primeros k símbolos se tiene que haber repetido algún estado. Sea q el primer estado que aparece dos veces.

Entonces β es el prefijo que consume antes que aparezca q por primera vez y γ lo que se consume entre la primera y la segunda vez (es no vacía dado que es un DFA).

Prueba del Lema de bombeo

Sea L regular. Tenemos que encontrar $k \in \mathbb{N}$ tal que:

Toda palabra $\alpha \in L$ larga ($\geq k$) tiene un prefijo $\beta\gamma$ corto ($\leq k$) con una parte ($\gamma \neq \epsilon$) “repetible” (sin salirse de L).

Demostración.


Sea \mathbb{A} un DFA tal que $L(\mathbb{A}) = L$, y sea k la cantidad de estados de \mathbb{A} .

Si α es más larga que k y es aceptada por \mathbb{A} , al consumirse los primeros k símbolos se tiene que haber repetido algún estado. Sea q el primer estado que aparece dos veces.


Entonces β es el prefijo que consume antes que aparezca q por primera vez y γ lo que se consume entre la primera y la segunda vez (es no vacía dado que es un DFA).

Como después de consumir γ vuelvo a q , puedo hacer ese bucle todas las veces que quiera.

Volviendo al ejemplo




Volviendo al ejemplo



$$\begin{array}{c} \epsilon \\ \beta \end{array} pp \xrightarrow{0} pi \xrightarrow{1} ii \xrightarrow{0} ip \xrightarrow{1} pp \xrightarrow{0} pi \xrightarrow{1} ii$$

$\underbrace{\hspace{15em}}_{\gamma}$

Volviendo al ejemplo



$$\begin{array}{c}
 \epsilon \\
 \beta
 \end{array}
 pp \xrightarrow{0} pi \xrightarrow{1} ii \xrightarrow{0} ip \xrightarrow{1} pp \xrightarrow{0} pi \xrightarrow{1} ii$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\gamma}$

$$pp \xrightarrow{1} ip \xrightarrow{0} ii \xrightarrow{0} ip \xrightarrow{0} ii$$

$\underbrace{\hspace{2em}}_{\beta} \quad \underbrace{\hspace{4em}}_{\gamma}$

Aplicación del Lema

L regular \implies existe $k \in \mathbb{N}$ tal que para toda cadena $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$ existen palabras β, γ, δ tales que $\alpha = \beta\gamma\delta$, $\gamma \neq \epsilon$, $|\beta\gamma| \leq k$, y para todo $n > 0$, $\beta\gamma^n\delta \in L$.

Aplicación del Lema

L regular \implies existe $k \in \mathbb{N}$ tal que para toda cadena $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$ existen palabras β, γ, δ tales que $\alpha = \beta\gamma\delta$, $\gamma \neq \epsilon$, $|\beta\gamma| \leq k$, y para todo $n > 0$, $\beta\gamma^n\delta \in L$.

Realmente, el Lema de Bombeo se usa para ver que un lenguaje **no** es regular.

Aplicación del Lema

L regular \implies existe $k \in \mathbb{N}$ tal que para toda cadena $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$ existen palabras β, γ, δ tales que $\alpha = \beta\gamma\delta$, $\gamma \neq \epsilon$, $|\beta\gamma| \leq k$, y para todo $n > 0$, $\beta\gamma^n\delta \in L$.

Realmente, el Lema de Bombeo se usa para ver que un lenguaje **no** es regular.

¡Contrarrecíproca!

Si para todo $k \in \mathbb{N}$ existe $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$ tal que para todas β, γ, δ tales que $\alpha = \beta\gamma\delta$, $\gamma \neq \epsilon$ y $|\beta\gamma| \leq k$, existe $n > 0$ tal que $\beta\gamma^n\delta \notin L$, entonces L no es regular

Aplicación del Lema

L regular \implies existe $k \in \mathbb{N}$ tal que para toda cadena $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$ existen palabras β, γ, δ tales que $\alpha = \beta\gamma\delta$, $\gamma \neq \epsilon$, $|\beta\gamma| \leq k$, y para todo $n > 0$, $\beta\gamma^n\delta \in L$.

Realmente, el Lema de Bombeo se usa para ver que un lenguaje **no** es regular.

¡Contrarrecíproca!

Si para todo $k \in \mathbb{N}$ existe $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$ tal que para todas β, γ, δ tales que $\alpha = \beta\gamma\delta$, $\gamma \neq \epsilon$ y $|\beta\gamma| \leq k$, existe $n > 0$ tal que $\beta\gamma^n\delta \notin L$, entonces L no es regular

Si hay palabras en L arbitrariamente largas que no tienen parte repetible al principio, entonces L no es regular



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba1613-2013
400
AÑOS

Aplicación del Lema, versión juego

Si para todo $k \in \mathbb{N}$ existe $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$ tal que para todas β, γ, δ tales que $\alpha = \beta\gamma\delta$, $\gamma \neq \epsilon$ y $|\beta\gamma| \leq k$, existe $n > 0$ tal que $\beta\gamma^n\delta \notin L$, entonces L no es regular

Aplicación del Lema, versión juego

Si **para todo** $k \in \mathbb{N}$ **existe** $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$ tal que **para todas** β, γ, δ tales que $\alpha = \beta\gamma\delta$, $\gamma \neq \epsilon$ y $|\beta\gamma| \leq k$, **existe** $n > 0$ tal que $\beta\gamma^n\delta \notin L$, entonces L no es regular

En los “**para todo**” juega el adversario y en los “**existe**” jugamos nosotros.

Aplicación del Lema, versión juego

Si **para todo** $k \in \mathbb{N}$ **existe** $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$ tal que **para todas** β, γ, δ tales que $\alpha = \beta\gamma\delta$, $\gamma \neq \epsilon$ y $|\beta\gamma| \leq k$, **existe** $n > 0$ tal que $\beta\gamma^n\delta \notin L$, entonces L no es regular

En los “**para todo**” juega el adversario y en los “**existe**” jugamos nosotros.

- 1 El adversario elige $k \in \mathbb{N}$ (no lo conocemos).

Aplicación del Lema, versión juego

Si **para todo** $k \in \mathbb{N}$ **existe** $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$ tal que **para todas** β, γ, δ tales que $\alpha = \beta\gamma\delta$, $\gamma \neq \epsilon$ y $|\beta\gamma| \leq k$, **existe** $n > 0$ tal que $\beta\gamma^n\delta \notin L$, entonces L no es regular

En los “**para todo**” juega el adversario y en los “**existe**” jugamos nosotros.

- 1** El adversario elige $k \in \mathbb{N}$ (no lo conocemos).
- 2** Nosotros debemos dar $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$.

Aplicación del Lema, versión juego

Si **para todo** $k \in \mathbb{N}$ **existe** $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$ tal que **para todas** β, γ, δ tales que $\alpha = \beta\gamma\delta$, $\gamma \neq \epsilon$ y $|\beta\gamma| \leq k$, **existe** $n > 0$ tal que $\beta\gamma^n\delta \notin L$, entonces L no es regular

En los “**para todo**” juega el adversario y en los “**existe**” jugamos nosotros.

- 1** El adversario elige $k \in \mathbb{N}$ (no lo conocemos).
- 2** Nosotros debemos dar $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$.
- 3** El adversario descompone α en tres pedazos $\beta\gamma\delta$ (pero debe cumplir que $|\beta\gamma| \leq k$ y que $\gamma \neq \epsilon$).

Aplicación del Lema, versión juego

Si **para todo** $k \in \mathbb{N}$ **existe** $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$ tal que **para todas** β, γ, δ tales que $\alpha = \beta\gamma\delta$, $\gamma \neq \epsilon$ y $|\beta\gamma| \leq k$, **existe** $n > 0$ tal que $\beta\gamma^n\delta \notin L$, entonces L no es regular

En los “**para todo**” juega el adversario y en los “**existe**” jugamos nosotros.

- 1** El adversario elige $k \in \mathbb{N}$ (no lo conocemos).
- 2** Nosotros debemos dar $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$.
- 3** El adversario descompone α en tres pedazos $\beta\gamma\delta$ (pero debe cumplir que $|\beta\gamma| \leq k$ y que $\gamma \neq \epsilon$).
- 4** Nosotros damos un $n > 0$ y armamos $\beta\gamma^n\delta \notin L$.

Aplicación del Lema, versión juego

Si **para todo** $k \in \mathbb{N}$ **existe** $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$ tal que **para todas** β, γ, δ tales que $\alpha = \beta\gamma\delta$, $\gamma \neq \epsilon$ y $|\beta\gamma| \leq k$, **existe** $n > 0$ tal que $\beta\gamma^n\delta \notin L$, entonces L no es regular

En los “**para todo**” juega el adversario y en los “**existe**” jugamos nosotros.

- 1** El adversario elige $k \in \mathbb{N}$ (no lo conocemos).
- 2** Nosotros debemos dar $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$.
- 3** El adversario descompone α en tres pedazos $\beta\gamma\delta$ (pero debe cumplir que $|\beta\gamma| \leq k$ y que $\gamma \neq \epsilon$).
- 4** Nosotros damos un $n > 0$ y armamos $\beta\gamma^n\delta \notin L$.

Si podemos dar una estrategia para ganar siempre este juego, entonces L no es regular.

Ejemplo de estrategia

- 1 El adversario elige $k \in \mathbb{N}$.
- 2 Nosotros damos $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$.
- 3 El adversario descompone α como $\beta\gamma\delta$ (con $|\beta\gamma| \leq k$ y que $\gamma \neq \epsilon$).
- 4 Nosotros damos un $n > 0$ y armamos $\beta\gamma^n\delta \notin L$.

Ejemplo de estrategia

- 1 El adversario elige $k \in \mathbb{N}$.
- 2 Nosotros damos $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$.
- 3 El adversario descompone α como $\beta\gamma\delta$ (con $|\beta\gamma| \leq k$ y que $\gamma \neq \epsilon$).
- 4 Nosotros damos un $n > 0$ y armamos $\beta\gamma^n\delta \notin L$.

Estrategia para ver que $L_{01} := \{0^n 1^n : n \in \mathbb{N}\}$ no es regular

Ejemplo de estrategia

- 1 El adversario elige $k \in \mathbb{N}$.
- 2 Nosotros damos $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$.
- 3 El adversario descompone α como $\beta\gamma\delta$ (con $|\beta\gamma| \leq k$ y que $\gamma \neq \epsilon$).
- 4 Nosotros damos un $n > 0$ y armamos $\beta\gamma^n\delta \notin L$.

Estrategia para ver que $L_{01} := \{0^n 1^n : n \in \mathbb{N}\}$ no es regular

- Adversario elige k .

Ejemplo de estrategia

- 1 El adversario elige $k \in \mathbb{N}$.
- 2 Nosotros damos $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$.
- 3 El adversario descompone α como $\beta\gamma\delta$ (con $|\beta\gamma| \leq k$ y que $\gamma \neq \epsilon$).
- 4 Nosotros damos un $n > 0$ y armamos $\beta\gamma^n\delta \notin L$.

Estrategia para ver que $L_{01} := \{0^n 1^n : n \in \mathbb{N}\}$ no es regular

- Adversario elige k .
- Nosotros proponemos $0^k 1^k \in L$.

Ejemplo de estrategia

- 1 El adversario elige $k \in \mathbb{N}$.
- 2 Nosotros damos $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$.
- 3 El adversario descompone α como $\beta\gamma\delta$ (con $|\beta\gamma| \leq k$ y que $\gamma \neq \epsilon$).
- 4 Nosotros damos un $n > 0$ y armamos $\beta\gamma^n\delta \notin L$.

Estrategia para ver que $L_{01} := \{0^n 1^n : n \in \mathbb{N}\}$ no es regular

- Adversario elige k .
- Nosotros proponemos $0^k 1^k \in L$.
- Adversario descompone $0^k 1^k = \beta\gamma\delta$

Ejemplo de estrategia

- 1 El adversario elige $k \in \mathbb{N}$.
- 2 Nosotros damos $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$.
- 3 El adversario descompone α como $\beta\gamma\delta$ (con $|\beta\gamma| \leq k$ y que $\gamma \neq \epsilon$).
- 4 Nosotros damos un $n > 0$ y armamos $\beta\gamma^n\delta \notin L$.

Estrategia para ver que $L_{01} := \{0^n 1^n : n \in \mathbb{N}\}$ no es regular

- Adversario elige k .
- Nosotros proponemos $0^k 1^k \in L$.
- Adversario descompone $0^k 1^k = \beta\gamma\delta$
¡ $\beta\gamma$ está hecha sólo de ceros!



UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba



Ejemplo de estrategia

- 1 El adversario elige $k \in \mathbb{N}$.
- 2 Nosotros damos $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$.
- 3 El adversario descompone α como $\beta\gamma\delta$ (con $|\beta\gamma| \leq k$ y que $\gamma \neq \epsilon$).
- 4 Nosotros damos un $n > 0$ y armamos $\beta\gamma^n\delta \notin L$.

Estrategia para ver que $L_{01} := \{0^n 1^n : n \in \mathbb{N}\}$ no es regular

- Adversario elige k .
- Nosotros proponemos $0^k 1^k \in L$.
- Adversario descompone $0^k 1^k = \beta\gamma\delta$
¡ $\beta\gamma$ está hecha sólo de ceros!
- Nosotros jugamos $n = 2$ y ganamos (porque $\beta\gamma^2\delta$ tiene más 0s que 1s y entonces no está en L_{01}).

Ejemplo de estrategia

- 1 El adversario elige $k \in \mathbb{N}$.
- 2 Nosotros damos $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq k$.
- 3 El adversario descompone α como $\beta\gamma\delta$ (con $|\beta\gamma| \leq k$ y que $\gamma \neq \epsilon$).
- 4 Nosotros damos un $n > 0$ y armamos $\beta\gamma^n\delta \notin L$.

Estrategia para ver que $L_{01} := \{0^n 1^n : n \in \mathbb{N}\}$ no es regular

- Adversario elige k .
- Nosotros proponemos $0^k 1^k \in L$.
- Adversario descompone $0^k 1^k = \beta\gamma\delta$
¡ $\beta\gamma$ está hecha sólo de ceros!
- Nosotros jugamos $n = 2$ y ganamos (porque $\beta\gamma^2\delta$ tiene más 0s que 1s y entonces no está en L_{01}).

Si bien $L_{01} = \{0^n 1^n : n \in \mathbb{N}\}$ no es regular, se puede describir de una manera muy simple

Lenguajes libres de contexto

Si bien $L_{01} = \{0^n 1^n : n \in \mathbb{N}\}$ no es regular, se puede describir de una manera muy simple

L_{01} es libre de contexto

$$S \longrightarrow 0S1$$

$$S \longrightarrow \epsilon$$

Lenguajes libres de contexto

Si bien $L_{01} = \{0^n 1^n : n \in \mathbb{N}\}$ no es regular, se puede describir de una manera muy simple

L_{01} es libre de contexto

$$S \longrightarrow 0S1$$

$$S \longrightarrow \epsilon$$

Esto es un ejemplo de **gramática libre de contexto**. Podemos **producir** cualquier palabra de L_{01} :

Lenguajes libres de contexto

Si bien $L_{01} = \{0^n 1^n : n \in \mathbb{N}\}$ no es regular, se puede describir de una manera muy simple

L_{01} es libre de contexto

$$S \longrightarrow 0 S 1$$

$$S \longrightarrow \epsilon$$

Esto es un ejemplo de **gramática libre de contexto**. Podemos **producir** cualquier palabra de L_{01} :

$$S \Longrightarrow 0 S 1$$

Lenguajes libres de contexto

Si bien $L_{01} = \{0^n 1^n : n \in \mathbb{N}\}$ no es regular, se puede describir de una manera muy simple

L_{01} es libre de contexto

$$S \longrightarrow 0S1$$

$$S \longrightarrow \epsilon$$

Esto es un ejemplo de **gramática libre de contexto**. Podemos **producir** cualquier palabra de L_{01} :

$$S \implies 0S1 \implies 00S11$$

Lenguajes libres de contexto

Si bien $L_{01} = \{0^n 1^n : n \in \mathbb{N}\}$ no es regular, se puede describir de una manera muy simple

L_{01} es libre de contexto

$$S \longrightarrow 0S1$$

$$S \longrightarrow \epsilon$$

Esto es un ejemplo de **gramática libre de contexto**. Podemos **producir** cualquier palabra de L_{01} :

$$S \Longrightarrow 0S1 \Longrightarrow 00S11 \Longrightarrow 000S111$$

Lenguajes libres de contexto

Si bien $L_{01} = \{0^n 1^n : n \in \mathbb{N}\}$ no es regular, se puede describir de una manera muy simple

L_{01} es libre de contexto

$$S \longrightarrow 0S1$$

$$S \longrightarrow \epsilon$$

Esto es un ejemplo de **gramática libre de contexto**. Podemos **producir** cualquier palabra de L_{01} :

$$S \Longrightarrow 0S1 \Longrightarrow 00S11 \Longrightarrow 000S111 \Longrightarrow 000\epsilon111 = 000111.$$

Una CFG $G = (V, T, P, S)$ está dada por:

- **Variables** (o símbolos **no terminales**): Definen las distintas *categorías sintácticas*.

Una CFG $G = (V, T, P, S)$ está dada por:

- **Variables** (o símbolos **no terminales**): Definen las distintas *categorías sintácticas*.

$$V_{01} := \{S\}.$$

Una CFG $G = (V, T, P, S)$ está dada por:

- **Variables** (o símbolos **no terminales**): Definen las distintas *categorías sintácticas*.

$$V_{01} := \{S\}.$$

- **Alfabeto terminal**: Conjunto de símbolos sobre los que definimos el lenguaje.

$$T_{01} := \{0, 1\}.$$

Una CFG $G = (V, T, P, S)$ está dada por:

- **Variables** (o símbolos **no terminales**): Definen las distintas *categorías sintácticas*.

$$V_{01} := \{S\}.$$

- **Alfabeto terminal**: Conjunto de símbolos sobre los que definimos el lenguaje.

$$T_{01} := \{0, 1\}.$$

- **Símbolo inicial**: Es una variable que determina el lenguaje que estamos generando.

$$S_{01} := S.$$

Una CFG $G = (V, T, P, S)$ está dada por:

- **Variables** (o símbolos **no terminales**): Definen las distintas *categorías sintácticas*.
 $V_{01} := \{S\}$.
- **Alfabeto terminal**: Conjunto de símbolos sobre los que definimos el lenguaje.
 $T_{01} := \{0, 1\}$.
- **Símbolo inicial**: Es una variable que determina el lenguaje que estamos generando.
 $S_{01} := S$.
- **Reglas (o producciones)**: representan la definición recursiva del lenguaje: son de la forma $U \rightarrow \alpha$ donde $\alpha \in (V \cup T)^*$.
Decimos que U es la *cabeza* y α el *cuerpo*.

Gramática para expresiones aritméticas

$$G_{ar} = (\{E, N, D, I\}, \{a, 0, \dots, 9, +, *, (,)\}, P_{ar}, E)$$

$$E \longrightarrow N \mid I \mid E + E \mid E * E \mid (E)$$

$$I \longrightarrow a \mid I0 \mid \dots \mid I9$$

$$N \longrightarrow 1D \mid \dots \mid 9D$$

$$D \longrightarrow 0D \mid \dots \mid 9D \mid \epsilon$$

Gramática para expresiones aritméticas

$$G_{ar} = (\{E, N, D, I\}, \{a, 0, \dots, 9, +, *, (,)\}, P_{ar}, E)$$

$$E \longrightarrow N \mid I \mid E + E \mid E * E \mid (E)$$

$$I \longrightarrow a \mid I0 \mid \dots \mid I9$$

$$N \longrightarrow 1D \mid \dots \mid 9D$$

$$D \longrightarrow 0D \mid \dots \mid 9D \mid \epsilon$$

Sean $\alpha, \beta \in (V \cup T)^*$.

Definición

α **deriva** β (" $\alpha \Longrightarrow \beta$ ") si β se obtiene reemplazando en α una variable de V por el cuerpo de una producción $V \longrightarrow \gamma$:

$$\underbrace{\alpha' V \alpha''}_{\alpha} \Longrightarrow \underbrace{\alpha' \gamma \alpha''}_{\beta}$$