

Introducción a la Lógica y la Computación

Mariana Badano Héctor Gramaglia
Pedro Sánchez Terraf Mauricio Tellechea
Guido Ivetta

FaMAF, 8 de septiembre de 2021

1 Repaso

- Otra vuelta a los teoremas de representación
- Teorema de representación de álgebras de Boole finitas

2 Teorema de representación de reticulados distributivos finitos

- Elementos \vee -irreducibles
- Conjuntos decrecientes de un poset
- Teorema de Birkhoff
- Caracterizaciones de distributividad

3 EXTRA: Construcciones con Estructuras

- Productos directos de posets
- Productos directos de retículos
- Suma directa de posets
- Caracterización de D_n

Otra vuelta a los teoremas de representación

Sea (P, \leq) un poset, y sea $F : P \rightarrow \mathcal{P}(P)$ definida por

$$F(d) := d \downarrow = \{x \in P : x \leq d\}$$

Otra vuelta a los teoremas de representación

Sea (P, \leq) un poset, y sea $F : P \rightarrow \mathcal{P}(P)$ definida por

$$F(d) := d\downarrow = \{x \in P : x \leq d\}$$

Tenemos:

- F preserva orden **en ambas direcciones**: para todos $d, c \in P$,
 $d \leq c \iff d\downarrow \subseteq c\downarrow$

Otra vuelta a los teoremas de representación

Sea (P, \leq) un poset, y sea $F : P \rightarrow \mathcal{P}(P)$ definida por

$$F(d) := d\downarrow = \{x \in P : x \leq d\}$$

Tenemos:

- F preserva orden **en ambas direcciones**: para todos $d, c \in P$,
 $d \leq c \iff d\downarrow \subseteq c\downarrow$; **esto implica que**
- F es inyectiva

Otra vuelta a los teoremas de representación

Sea (P, \leq) un poset, y sea $F : P \rightarrow \mathcal{P}(P)$ definida por

$$F(d) := d\downarrow = \{x \in P : x \leq d\}$$

Tenemos:

- F preserva orden **en ambas direcciones**: para todos $d, c \in P$,
 $d \leq c \iff d\downarrow \subseteq c\downarrow$; esto implica que
- F es inyectiva (o bien, porque $\sup(F(d)) = d$ para todo $d \in P$).

Otra vuelta a los teoremas de representación

Sea (P, \leq) un poset, y sea $F : P \rightarrow \mathcal{P}(P)$ definida por

$$F(d) := d\downarrow = \{x \in P : x \leq d\}$$

Tenemos:

- F preserva orden **en ambas direcciones**: para todos $d, c \in P$,
 $d \leq c \iff d\downarrow \subseteq c\downarrow$; esto implica que
- F es inyectiva (o bien, porque $\sup(F(d)) = d$ para todo $d \in P$).

Luego, $F : P \rightarrow \mathcal{P}(P)$ es un isomorfismo entre (P, \leq) y el subposet $(F(P), \subseteq)$ de $(\mathcal{P}(P), \subseteq)$.

Otra vuelta a los teoremas de representación

Sea (P, \leq) un poset, y sea $F : P \rightarrow \mathcal{P}(P)$ definida por

$$F(d) := d\downarrow = \{x \in P : x \leq d\}$$

Tenemos:

- F preserva orden **en ambas direcciones**: para todos $d, c \in P$,
 $d \leq c \iff d\downarrow \subseteq c\downarrow$; esto implica que
- F es inyectiva (o bien, porque $\sup(F(d)) = d$ para todo $d \in P$).

Luego, $F : P \rightarrow \mathcal{P}(P)$ es un isomorfismo entre (P, \leq) y el subposet $(F(P), \subseteq)$ de $(\mathcal{P}(P), \subseteq)$.

Generalicemos **dónde** estamos representando.

Otra vuelta a los teoremas de representación

Sea (P, \leq) un poset, y sea $F : P \rightarrow \mathcal{P}(P)$ definida por

$$F(d) := d\downarrow = \{x \in P : x \leq d\}$$

Tenemos:

- F preserva orden **en ambas direcciones**: para todos $d, c \in P$,
 $d \leq c \iff d\downarrow \subseteq c\downarrow$; esto implica que
- F es inyectiva (o bien, porque $\sup(F(d)) = d$ para todo $d \in P$).

Luego, $F : P \rightarrow \mathcal{P}(P)$ es un isomorfismo entre (P, \leq) y el subposet $(F(P), \subseteq)$ de $(\mathcal{P}(P), \subseteq)$.

Generalicemos **dónde** estamos representando.

Otra vuelta a los teoremas de representación

Sea (P, \leq) un poset, y sea $F : P \rightarrow \mathcal{P}(Q)$ definida por

$$F(d) := d\downarrow = \{x \in Q : x \leq d\}$$

Tenemos:

- F preserva orden **en ambas direcciones**: para todos $d, c \in P$,
 $d \leq c \iff d\downarrow \subseteq c\downarrow$; esto implica que
- F es inyectiva (o bien, porque $\sup(F(d)) = d$ para todo $d \in P$).

Luego, $F : P \rightarrow \mathcal{P}(Q)$ es un isomorfismo entre (P, \leq) y el **subposet** $(F(P), \subseteq)$ de $(\mathcal{P}(Q), \subseteq)$.

Generalicemos **dónde** estamos representando.

Podemos tomar (un **subposet** de) las partes otro conjunto Q .

En la Representación de álgebras de Boole finitas

Si $(B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ es un álgebra de Boole finita,

$$F : B \rightarrow \mathcal{P}(At(B))$$
$$x \mapsto \{a \in At(B) : a \leq x\}$$

es un isomorfismo entre $(B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ y $(\mathcal{P}(At(B)), \cup, \cap, (\cdot)^c, \emptyset, B)$.

En la Representación de álgebras de Boole finitas

Si $(B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ es un álgebra de Boole finita,

$$F : B \rightarrow \mathcal{P}(At(B))$$
$$x \mapsto \{a \in At(B) : a \leq x\}$$

es un isomorfismo entre $(B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ y $(\mathcal{P}(At(B)), \cup, \cap, (\cdot)^c, \emptyset, B)$.

En la Representación de álgebras de Boole finitas

Si $(B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ es un álgebra de Boole finita,

$$F : B \rightarrow \mathcal{P}(At(B))$$
$$x \mapsto \{a \in At(B) : a \leq x\}$$

es un isomorfismo entre $(B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ y $(\mathcal{P}(At(B)), \cup, \cap, (\cdot)^c, \emptyset, B)$.
Notemos los siguientes puntos:

- La función F se define igual que para posets y preserva inmediatamente el orden $x \leq y \implies F(x) \subseteq F(y)$.

En la Representación de álgebras de Boole finitas

Si $(B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ es un álgebra de Boole finita,

$$F : B \rightarrow \mathcal{P}(At(B))$$
$$x \mapsto \{a \in At(B) : a \leq x\}$$

es un isomorfismo entre $(B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ y $(\mathcal{P}(At(B)), \cup, \cap, (\cdot)^c, \emptyset, B)$.
Notemos los siguientes puntos:

- La función F se define igual que para posets y preserva inmediatamente el orden $x \leq y \implies F(x) \subseteq F(y)$.
- La propiedad de
Separación Para todo $x, y \in B$ tales que $x \not\leq y$ existe $a \in At(B)$ tal que $a \leq x$ y $a \not\leq y$.

En la Representación de álgebras de Boole finitas

Si $(B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ es un álgebra de Boole finita,

$$F : B \rightarrow \mathcal{P}(At(B))$$
$$x \mapsto \{a \in At(B) : a \leq x\}$$

es un isomorfismo entre $(B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ y $(\mathcal{P}(At(B)), \cup, \cap, (\cdot)^c, \emptyset, B)$.
Notemos los siguientes puntos:

- La función F se define igual que para posets y preserva inmediatamente el orden $x \leq y \implies F(x) \subseteq F(y)$.

- La propiedad de

Separación Para todo $x, y \in B$ tales que $x \not\leq y$ existe $a \in At(B)$ tal que $a \leq x$ y $a \not\leq y$. $F(x) \subseteq F(y) \implies x \leq y$.

En la Representación de álgebras de Boole finitas

Si $(B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ es un álgebra de Boole finita,

$$F : B \rightarrow \mathcal{P}(At(B))$$
$$x \mapsto \{a \in At(B) : a \leq x\}$$

es un isomorfismo entre $(B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ y $(\mathcal{P}(At(B)), \cup, \cap, (\cdot)^c, \emptyset, B)$.
Notemos los siguientes puntos:

- La función F se define igual que para posets y preserva inmediatamente el orden $x \leq y \implies F(x) \subseteq F(y)$.

- La propiedad de

Separación Para todo $x, y \in B$ tales que $x \not\leq y$ existe $a \in At(B)$ tal que $a \leq x$ y $a \not\leq y$. $F(x) \subseteq F(y) \implies x \leq y$.

completa la prueba de 1-1 y luego de **incrustación**

En la Representación de álgebras de Boole finitas

Si $(B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ es un álgebra de Boole finita,

$$F : B \rightarrow \mathcal{P}(At(B))$$
$$x \mapsto \{a \in At(B) : a \leq x\}$$

es un isomorfismo entre $(B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ y $(\mathcal{P}(At(B)), \cup, \cap, (\cdot)^c, \emptyset, B)$.
Notemos los siguientes puntos:

- La función F se define igual que para posets y preserva inmediatamente el orden $x \leq y \implies F(x) \subseteq F(y)$.

- La propiedad de

Separación Para todo $x, y \in B$ tales que $x \not\leq y$ existe $a \in At(B)$ tal que $a \leq x$ y $a \not\leq y$. $F(x) \subseteq F(y) \implies x \leq y$.

completa la prueba de 1-1 y luego de **incrustación**

- $F(\sup(A)) = A$ para todo $A \subseteq At(B)$ sale por **distributividad** e implica F sobre (y luego un isomorfismo).

Dónde representamos y con qué

Todo poset P se incrusta $(\mathcal{P}(Q), \subseteq)$ para algún Q (es isomorfo $F(P)$).

$$F : P \rightarrow F(P) \subseteq \mathcal{P}(Q)$$

Dónde representamos y con qué

Todo poset P se incrusta $(\mathcal{P}(Q), \subseteq)$ para algún Q (es isomorfo $F(P)$).

$$F : P \rightarrow F(P) \subseteq \mathcal{P}(Q)$$

- Tenemos libertad de elegir Q según cómo sea P ($Q := P$ siempre funciona, y para álgebras de Boole $Q := At(B)$ es mejor).

Dónde representamos y con qué

Todo poset P se incrusta $(\mathcal{P}(Q), \subseteq)$ para algún Q (es isomorfo $F(P)$).

$$F : P \rightarrow F(P) \subseteq \mathcal{P}(Q)$$

- Tenemos libertad de elegir Q según cómo sea P ($Q := P$ siempre funciona, y para álgebras de Boole $Q := At(B)$ es mejor).
- La representación estará completa si entendemos bien cuáles subconjuntos están en la **imagen de F** (ideales principales para posets generales, todos en el caso booleano).

Dónde representamos y con qué

Todo poset P se incrusta $(\mathcal{P}(Q), \subseteq)$ para algún Q (es isomorfo $F(P)$).

$$F : P \rightarrow F(P) \subseteq \mathcal{P}(Q)$$

- Tenemos libertad de elegir Q según cómo sea P ($Q := P$ siempre funciona, y para álgebras de Boole $Q := At(B)$ es mejor).
- La representación estará completa si entendemos bien cuáles subconjuntos están en la imagen de F (ideales principales para posets generales, todos en el caso booleano).

A continuación determinaremos, para el caso de los reticulados distributivos L :

Dónde representamos y con qué

Todo poset P se incrusta $(\mathcal{P}(Q), \subseteq)$ para algún Q (es isomorfo $F(P)$).

$$F : P \rightarrow F(P) \subseteq \mathcal{P}(Q)$$

- Tenemos libertad de elegir Q según cómo sea P ($Q := P$ siempre funciona, y para álgebras de Boole $Q := At(B)$ es mejor).
- La representación estará completa si entendemos bien cuáles subconjuntos están en la imagen de F (ideales principales para posets generales, todos en el caso booleano).

A continuación determinaremos, para el caso de los reticulados distributivos L :

- El conjunto Q donde representamos, $Irr(L)$, formado por los elementos *irreducibles* de L ,

Dónde representamos y con qué

Todo poset P se incrusta $(\mathcal{P}(Q), \subseteq)$ para algún Q (es isomorfo $F(P)$).

$$F : P \rightarrow F(P) \subseteq \mathcal{P}(Q)$$

- Tenemos libertad de elegir Q según cómo sea P ($Q := P$ siempre funciona, y para álgebras de Boole $Q := At(B)$ es mejor).
- La representación estará completa si entendemos bien cuáles subconjuntos están en la imagen de F (ideales principales para posets generales, todos en el caso booleano).

A continuación determinaremos, para el caso de los reticulados distributivos L :

- El conjunto Q donde representamos, $Irr(L)$, formado por los elementos *irreducibles* de L , y
- exactamente cuáles son los subconjuntos de $Irr(L)$ que están en $F(L)$: los *decrecientes*.

Definición

Un elemento x de un reticulado L es \vee -irreducible si

- 1 x no es el primer elemento, y
- 2 Para todos $y, z \in L$, si $x = y \vee z$, entonces $y = x$ ó $z = x$.

Denotaremos mediante $Irr(L)$ al conjunto de los elementos irreducibles de L .

Definición

Un elemento x de un reticulado L es \vee -irreducible si

- 1 x no es el primer elemento, y
- 2 Para todos $y, z \in L$, si $x = y \vee z$, entonces $y = x$ ó $z = x$.

Denotaremos mediante $Irr(L)$ al conjunto de los elementos irreducibles de L .

Resulta que si x_1, \dots, x_n son todos distintos de x , entonces $x \neq x_1 \vee \dots \vee x_n$.

Definición

Un elemento x de un reticulado L es \vee -irreducible si

- 1 x no es el primer elemento, y
- 2 Para todos $y, z \in L$, si $x = y \vee z$, entonces $y = x$ ó $z = x$.

Denotaremos mediante $Irr(L)$ al conjunto de los elementos irreducibles de L .

Resulta que si x_1, \dots, x_n son todos distintos de x , entonces $x \neq x_1 \vee \dots \vee x_n$.

Lema

Si L es finito, entonces $x \in L$ es \vee -irreducible \iff el conjunto $\{a \in L : a < x\} = x \downarrow \setminus \{x\}$ tiene máximo.

Definición

Un elemento x de un reticulado L es \vee -irreducible si

- 1 x no es el primer elemento, y
- 2 Para todos $y, z \in L$, si $x = y \vee z$, entonces $y = x$ ó $z = x$.

Denotaremos mediante $Irr(L)$ al conjunto de los elementos irreducibles de L .

Resulta que si x_1, \dots, x_n son todos distintos de x , entonces $x \neq x_1 \vee \dots \vee x_n$.

Lema

Si L es finito, entonces $x \in L$ es \vee -irreducible \iff el conjunto $\{a \in L : a < x\} = x \downarrow \setminus \{x\}$ tiene máximo.

Demostración.

El supremo de dicho conjunto **finito** no puede ser igual a x .

Conjuntos decrecientes de un poset

Sea (P, \leq) un poset.

Definición

Un subconjunto $D \subseteq P$ es **decreciente** si para todo $x, z \in P$ se tiene que:

$$x \in D \ \& \ z \leq x \implies z \in D.$$

Denotaremos mediante $\mathcal{D}(P)$ a la familia de todos los subconjuntos decrecientes de P .

Conjuntos decrecientes de un poset

Sea (P, \leq) un poset.

Definición

Un subconjunto $D \subseteq P$ es **decreciente** si para todo $x, z \in P$ se tiene que:

$$x \in D \ \& \ z \leq x \implies z \in D.$$

Denotaremos mediante $\mathcal{D}(P)$ a la familia de todos los subconjuntos decrecientes de P .

Ejemplo

- P es decreciente

Conjuntos decrecientes de un poset

Sea (P, \leq) un poset.

Definición

Un subconjunto $D \subseteq P$ es **decreciente** si para todo $x, z \in P$ se tiene que:

$$x \in D \ \& \ z \leq x \implies z \in D.$$

Denotaremos mediante $\mathcal{D}(P)$ a la familia de todos los subconjuntos decrecientes de P .

Ejemplo

- P es decreciente (consecuente trivial).

Conjuntos decrecientes de un poset

Sea (P, \leq) un poset.

Definición

Un subconjunto $D \subseteq P$ es **decreciente** si para todo $x, z \in P$ se tiene que:

$$x \in D \ \& \ z \leq x \implies z \in D.$$

Denotaremos mediante $\mathcal{D}(P)$ a la familia de todos los subconjuntos decrecientes de P .

Ejemplo

- P es decreciente (consecuente trivial).
- \emptyset lo es

Conjuntos decrecientes de un poset

Sea (P, \leq) un poset.

Definición

Un subconjunto $D \subseteq P$ es **decreciente** si para todo $x, z \in P$ se tiene que:

$$x \in D \ \& \ z \leq x \implies z \in D.$$

Denotaremos mediante $\mathcal{D}(P)$ a la familia de todos los subconjuntos decrecientes de P .

Ejemplo

- P es decreciente (consecuente trivial).
- \emptyset lo es (antecedente falso).

Conjuntos decrecientes de un poset

Sea (P, \leq) un poset.

Definición

Un subconjunto $D \subseteq P$ es **decreciente** si para todo $x, z \in P$ se tiene que:

$$x \in D \ \& \ z \leq x \implies z \in D.$$

Denotaremos mediante $\mathcal{D}(P)$ a la familia de todos los subconjuntos decrecientes de P .

Ejemplo

- P es decreciente (consecuente trivial).
- \emptyset lo es (antecedente falso).
- $d \downarrow$ es decreciente (por transitividad).

Conjuntos decrecientes de un poset

Sea (P, \leq) un poset.

Definición

Un subconjunto $D \subseteq P$ es **decreciente** si para todo $x, z \in P$ se tiene que:

$$x \in D \ \& \ z \leq x \implies z \in D.$$

Denotaremos mediante $\mathcal{D}(P)$ a la familia de todos los subconjuntos decrecientes de P .

Ejemplo

- P es decreciente (consecuente trivial).
- \emptyset lo es (antecedente falso).
- $d\downarrow$ es decreciente (por transitividad).
- Cualquier conjunto de átomos junto con el primer elemento.



UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba



Lema

Si D_1 y D_2 son decrecientes en (P, \leq) , entonces $D_1 \cap D_2$ y $D_1 \cup D_2$ también lo son.

Lema

Si D_1 y D_2 son decrecientes en (P, \leq) , entonces $D_1 \cap D_2$ y $D_1 \cup D_2$ también lo son.

Ejercicio

- 1 Probar la segunda afirmación.
- 2 ¿Valen las mismas propiedades de clausura para los ideales principales?
- 3 ¿Cuántos decrecientes tiene $(\{2, 4, 3, 9\}, |)$?

Conjuntos decrecientes de un poset

Lema

Si D_1 y D_2 son decrecientes en (P, \leq) , entonces $D_1 \cap D_2$ y $D_1 \cup D_2$ también lo son.

Ejercicio

- 1 Probar la segunda afirmación.
- 2 ¿Valen las mismas propiedades de clausura para los ideales principales?
- 3 ¿Cuántos decrecientes tiene $(\{2, 4, 3, 9\}, |)$? → [Actividad en Aula virtual!](#)

Conjuntos decrecientes de un poset

Lema

Si D_1 y D_2 son decrecientes en (P, \leq) , entonces $D_1 \cap D_2$ y $D_1 \cup D_2$ también lo son.

Ejercicio

- 1 Probar la segunda afirmación.
- 2 ¿Valen las mismas propiedades de clausura para los ideales principales?
- 3 ¿Cuántos decrecientes tiene $(\{2, 4, 3, 9\}, |)$? → [Actividad en Aula virtual!](#)

Corolario

$(\mathcal{D}(P), \subseteq)$ es un subreticulado de $(\mathcal{P}(P), \subseteq)$, y luego es distributivo.

Teorema (Birkhoff)

Sea L un reticulado distributivo finito. Entonces la función

$$F : L \rightarrow \mathcal{D}(\text{Irr}(L))$$
$$x \mapsto \{a \in \text{Irr}(L) : a \leq x\}$$

es un isomorfismo entre (L, \leq) y $(\mathcal{D}(\text{Irr}(L)), \subseteq)$ con inversa sup.

Teorema (Birkhoff)

Sea L un reticulado distributivo finito. Entonces la función

$$F : L \rightarrow \mathcal{D}(\text{Irr}(L))$$
$$x \mapsto \{a \in \text{Irr}(L) : a \leq x\}$$

es un isomorfismo entre (L, \leq) y $(\mathcal{D}(\text{Irr}(L)), \subseteq)$ con inversa sup .

Notemos:

- $\{a \in \text{Irr}(L) : a \leq x\}$ siempre es un decreciente de $\text{Irr}(L)$ (está bien definida).

Teorema (Birkhoff)

Sea L un reticulado distributivo finito. Entonces la función

$$F : L \rightarrow \mathcal{D}(\text{Irr}(L))$$
$$x \mapsto \{a \in \text{Irr}(L) : a \leq x\}$$

es un isomorfismo entre (L, \leq) y $(\mathcal{D}(\text{Irr}(L)), \subseteq)$ con inversa sup .

Notemos:

- $\{a \in \text{Irr}(L) : a \leq x\}$ siempre es un decreciente de $\text{Irr}(L)$ (está bien definida).
- Probaremos la propiedad de **Separación** usando \vee -irreducibles.

Teorema (Birkhoff)

Sea L un reticulado distributivo finito. Entonces la función

$$F : L \rightarrow \mathcal{D}(\text{Irr}(L))$$
$$x \mapsto \{a \in \text{Irr}(L) : a \leq x\}$$

es un isomorfismo entre (L, \leq) y $(\mathcal{D}(\text{Irr}(L)), \subseteq)$ con inversa sup .

Notemos:

- $\{a \in \text{Irr}(L) : a \leq x\}$ siempre es un decreciente de $\text{Irr}(L)$ (está bien definida).
- Probaremos la propiedad de **Separación** usando \vee -irreducibles. Como antes, esto nos dará que L se incrusta en $\mathcal{D}(\text{Irr}(L))$.

Teorema (Birkhoff)

Sea L un reticulado distributivo finito. Entonces la función

$$F : L \rightarrow \mathcal{D}(\text{Irr}(L))$$
$$x \mapsto \{a \in \text{Irr}(L) : a \leq x\}$$

es un isomorfismo entre (L, \leq) y $(\mathcal{D}(\text{Irr}(L)), \subseteq)$ con inversa sup .

Notemos:

- $\{a \in \text{Irr}(L) : a \leq x\}$ siempre es un decreciente de $\text{Irr}(L)$ (está bien definida).
- Probaremos la propiedad de **Separación** usando \vee -irreducibles. Como antes, esto nos dará que L se incrusta en $\mathcal{D}(\text{Irr}(L))$.
- La distributividad se usa **solamente** para ver que $F(\text{sup } D) = D$ para todo $D \in \mathcal{D}(\text{Irr}(L))$ (luego F es sobre).

Lema (Separación)

Sea L un reticulado (arbitrario) finito. Para todo $x, y \in L$ tales que $x \not\leq y$ existe $a \in \text{Irr}(L)$ tal que $a \leq x$ y $a \not\leq y$.

Lema (Separación)

Sea L un reticulado (arbitrario) finito. Para todo $x, y \in L$ tales que $x \not\leq y$ existe $a \in \text{Irr}(L)$ tal que $a \leq x$ y $a \not\leq y$.

$F(x) \subseteq F(y)$ implica $x \leq y$.

Prueba del Teorema de Birkhoff

Lema (Separación)

Sea L un reticulado (arbitrario) finito. Para todo $x, y \in L$ tales que $x \not\leq y$ existe $a \in \text{Irr}(L)$ tal que $a \leq x$ y $a \not\leq y$.

$F(x) \subseteq F(y)$ implica $x \leq y$.

Prueba del Teorema de Representación.

Prueba del Teorema de Birkhoff

Lema (Separación)

Sea L un reticulado (arbitrario) finito. Para todo $x, y \in L$ tales que $x \not\leq y$ existe $a \in \text{Irr}(L)$ tal que $a \leq x$ y $a \not\leq y$.

$F(x) \subseteq F(y)$ implica $x \leq y$.

Prueba del Teorema de Representación.

- F preservan el orden en ambas direcciones.

Prueba del Teorema de Birkhoff

Lema (Separación)

Sea L un reticulado (arbitrario) finito. Para todo $x, y \in L$ tales que $x \not\leq y$ existe $a \in \text{Irr}(L)$ tal que $a \leq x$ y $a \not\leq y$.

$F(x) \subseteq F(y)$ implica $x \leq y$.

Prueba del Teorema de Representación.

- F preservan el orden en ambas direcciones.

Igual que antes

Prueba del Teorema de Birkhoff

Lema (Separación)

Sea L un reticulado (arbitrario) finito. Para todo $x, y \in L$ tales que $x \not\leq y$ existe $a \in Irr(L)$ tal que $a \leq x$ y $a \not\leq y$.

$F(x) \subseteq F(y)$ implica $x \leq y$.

Prueba del Teorema de Representación.

- F preservan el orden en ambas direcciones.

Igual que antes

- $D = F(\sup D) = \{a \in Irr(B) : a \leq \sup D\}$ para todo $D \in \mathcal{D}(Irr(B))$.

Prueba del Teorema de Birkhoff

Lema (Separación)

Sea L un reticulado (arbitrario) finito. Para todo $x, y \in L$ tales que $x \not\leq y$ existe $a \in Irr(L)$ tal que $a \leq x$ y $a \not\leq y$.

$F(x) \subseteq F(y)$ implica $x \leq y$.

Prueba del Teorema de Representación.

- F preservan el orden en ambas direcciones.

Igual que antes

- $D = F(\sup D) = \{a \in Irr(B) : a \leq \sup D\}$ para todo $D \in \mathcal{D}(Irr(B))$.

Vemos las dos inclusiones como antes

Nueva caracterización de la distributividad

Vimos que

$$F : L \rightarrow \mathcal{D}(\text{Irr}(L))$$
$$x \mapsto \{a \in \text{Irr}(L) : a \leq x\}$$

incrusta L en su imagen $F(L) \subseteq \mathcal{D}(\text{Irr}(L))$ sin usar distributividad.

Nueva caracterización de la distributividad

Vimos que

$$F : L \rightarrow \mathcal{D}(\text{Irr}(L))$$
$$x \mapsto \{a \in \text{Irr}(L) : a \leq x\}$$

incrusta L en su imagen $F(L) \subseteq \mathcal{D}(\text{Irr}(L))$ sin usar **distributividad**. Ésta sólo se usa para ver que F es sobreyectiva. Y si acaso lo fuera, automáticamente es un isomorfismo porque preserva el orden en ambas direcciones.

Nueva caracterización de la distributividad

Vimos que

$$F : L \rightarrow \mathcal{D}(\text{Irr}(L))$$
$$x \mapsto \{a \in \text{Irr}(L) : a \leq x\}$$

incrusta L en su imagen $F(L) \subseteq \mathcal{D}(\text{Irr}(L))$ sin usar distributividad. Ésta sólo se usa para ver que F es sobreyectiva. Y si acaso lo fuera, automáticamente es un isomorfismo porque preserva el orden en ambas direcciones.

Para conjuntos finitos, la única manera de que una inyección no sea sobreyectiva es que el **codominio** tenga cardinal más grande que su dominio.

Nueva caracterización de la distributividad

Vimos que

$$F : L \rightarrow \mathcal{D}(\text{Irr}(L))$$
$$x \mapsto \{a \in \text{Irr}(L) : a \leq x\}$$

incrusta L en su imagen $F(L) \subseteq \mathcal{D}(\text{Irr}(L))$ sin usar distributividad. Ésta sólo se usa para ver que F es sobreyectiva. Y si acaso lo fuera, automáticamente es un isomorfismo porque preserva el orden en ambas direcciones.

Para conjuntos finitos, la única manera de que una inyección no sea sobreyectiva es que el codominio tenga cardinal más grande que su dominio. Tenemos entonces:

Teorema

Sea L un reticulado finito. Si $|L| \geq |\mathcal{D}(\text{Irr}(L))|$, entonces L es distributivo.

Teorema

Sea L un reticulado finito. Son equivalentes:

- *L es distributivo;*

Teorema

Sea L un reticulado finito. Son equivalentes:

- L es distributivo;
- (Lema 5.1 Apunte) para todos $a, b, c \in L$,

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c);$$

Teorema

Sea L un reticulado finito. Son equivalentes:

- L es distributivo;
- (Lema 5.1 Apunte) para todos $a, b, c \in L$,

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c);$$

- (P5E9) para todos $a, b, c \in L$,

$$\left. \begin{array}{l} a \vee b = a \vee c \\ a \wedge b = a \wedge c \end{array} \right\} \implies b = c; y$$

Teorema

Sea L un reticulado finito. Son equivalentes:

- L es distributivo;
- (Lema 5.1 Apunte) para todos $a, b, c \in L$,

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c);$$

- (P5E9) para todos $a, b, c \in L$,

$$\left. \begin{array}{l} a \vee b = a \vee c \\ a \wedge b = a \wedge c \end{array} \right\} \implies b = c; y$$

- ni M_3 ni N_5 se incrustan en L .

Teorema

Sea L un reticulado finito. Son equivalentes:

- L es distributivo;
- (Lema 5.1 Apunte) para todos $a, b, c \in L$,

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c);$$

- (P5E9) para todos $a, b, c \in L$,

$$\left. \begin{array}{l} a \vee b = a \vee c \\ a \wedge b = a \wedge c \end{array} \right\} \implies b = c; y$$

- ni M_3 ni N_5 se incrustan en L .
- $|L| \geq |\mathcal{D}(\text{Irr}(L))|$ (y luego tienen el mismo cardinal).

Definición

El **producto directo** $(L, \leq_L) \times (M, \leq_M)$ de (L, \leq_L) y (M, \leq_M) tiene como universo a $L \times M$ y como orden parcial a la relación

$$(x_1, y_1) \leq_{L \times M} (x_2, y_2) \iff x_1 \leq_L x_2 \ \& \ y_1 \leq_M y_2.$$

Definimos además $L^1 := L$ y $L^{n+1} := L \times L^n$ para todo poset L .

Productos directos de posets

Definición

El **producto directo** $(L, \leq_L) \times (M, \leq_M)$ de (L, \leq_L) y (M, \leq_M) tiene como universo a $L \times M$ y como orden parcial a la relación

$$(x_1, y_1) \leq_{L \times M} (x_2, y_2) \iff x_1 \leq_L x_2 \ \& \ y_1 \leq_M y_2.$$

Definimos además $L^1 := L$ y $L^{n+1} := L \times L^n$ para todo poset L . ¿ L^0 ?

Productos directos de posets

Definición

El **producto directo** $(L, \leq_L) \times (M, \leq_M)$ de (L, \leq_L) y (M, \leq_M) tiene como universo a $L \times M$ y como orden parcial a la relación

$$(x_1, y_1) \leq_{L \times M} (x_2, y_2) \iff x_1 \leq_L x_2 \ \& \ y_1 \leq_M y_2.$$

Definimos además $L^1 := L$ y $L^{n+1} := L \times L^n$ para todo poset L . ¿ L^0 ?

Diferencias y similitudes con la multiplicación

$$L \times M \neq M \times L$$

$$L \times (M \times N) \neq (L \times M) \times N$$

Productos directos de posets

Definición

El **producto directo** $(L, \leq_L) \times (M, \leq_M)$ de (L, \leq_L) y (M, \leq_M) tiene como universo a $L \times M$ y como orden parcial a la relación

$$(x_1, y_1) \leq_{L \times M} (x_2, y_2) \iff x_1 \leq_L x_2 \ \& \ y_1 \leq_M y_2.$$

Definimos además $L^1 := L$ y $L^{n+1} := L \times L^n$ para todo poset L . ¿ L^0 ?

Diferencias y similitudes con la multiplicación

	$L \times M \neq M \times L$	$L \times (M \times N) \neq (L \times M) \times N$	
pero sí	$L \times M \cong M \times L$	$L \times (M \times N) \cong (L \times M) \times N$	(iso).

Productos directos de posets

Definición

El **producto directo** $(L, \leq_L) \times (M, \leq_M)$ de (L, \leq_L) y (M, \leq_M) tiene como universo a $L \times M$ y como orden parcial a la relación

$$(x_1, y_1) \leq_{L \times M} (x_2, y_2) \iff x_1 \leq_L x_2 \ \& \ y_1 \leq_M y_2.$$

Definimos además $L^1 := L$ y $L^{n+1} := L \times L^n$ para todo poset L . ¿ L^0 ?

Diferencias y similitudes con la multiplicación

	$L \times M \neq M \times L$	$L \times (M \times N) \neq (L \times M) \times N$	
pero sí	$L \times M \cong M \times L$	$L \times (M \times N) \cong (L \times M) \times N$	(iso).

Ejemplo

A las cadenas de 2, 3, 4, ... elementos las denotaremos **2, 3, 4**, etc.

Productos directos de posets

Definición

El **producto directo** $(L, \leq_L) \times (M, \leq_M)$ de (L, \leq_L) y (M, \leq_M) tiene como universo a $L \times M$ y como orden parcial a la relación

$$(x_1, y_1) \leq_{L \times M} (x_2, y_2) \iff x_1 \leq_L x_2 \ \& \ y_1 \leq_M y_2.$$

Definimos además $L^1 := L$ y $L^{n+1} := L \times L^n$ para todo poset L . ¿ L^0 ?

Diferencias y similitudes con la multiplicación

	$L \times M \neq M \times L$	$L \times (M \times N) \neq (L \times M) \times N$	
pero sí	$L \times M \cong M \times L$	$L \times (M \times N) \cong (L \times M) \times N$	(iso).

Ejemplo

A las cadenas de 2, 3, 4, ... elementos las denotaremos **2, 3, 4**, etc.

$$2 \times 2,$$

Productos directos de posets

Definición

El **producto directo** $(L, \leq_L) \times (M, \leq_M)$ de (L, \leq_L) y (M, \leq_M) tiene como universo a $L \times M$ y como orden parcial a la relación

$$(x_1, y_1) \leq_{L \times M} (x_2, y_2) \iff x_1 \leq_L x_2 \ \& \ y_1 \leq_M y_2.$$

Definimos además $L^1 := L$ y $L^{n+1} := L \times L^n$ para todo poset L . ¿ L^0 ?

Diferencias y similitudes con la multiplicación

	$L \times M \neq M \times L$	$L \times (M \times N) \neq (L \times M) \times N$	
pero sí	$L \times M \cong M \times L$	$L \times (M \times N) \cong (L \times M) \times N$	(iso).

Ejemplo

A las cadenas de 2, 3, 4, ... elementos las denotaremos **2, 3, 4**, etc.

$$2 \times 2, \quad 2 \times 3,$$

Productos directos de posets

Definición

El **producto directo** $(L, \leq_L) \times (M, \leq_M)$ de (L, \leq_L) y (M, \leq_M) tiene como universo a $L \times M$ y como orden parcial a la relación

$$(x_1, y_1) \leq_{L \times M} (x_2, y_2) \iff x_1 \leq_L x_2 \ \& \ y_1 \leq_M y_2.$$

Definimos además $L^1 := L$ y $L^{n+1} := L \times L^n$ para todo poset L . ¿ L^0 ?

Diferencias y similitudes con la multiplicación

	$L \times M \neq M \times L$	$L \times (M \times N) \neq (L \times M) \times N$	
pero sí	$L \times M \cong M \times L$	$L \times (M \times N) \cong (L \times M) \times N$	(iso).

Ejemplo

A las cadenas de 2, 3, 4, ... elementos las denotaremos **2**, **3**, **4**, etc.

$$2 \times 2, \quad 2 \times 3, \quad 2^n$$

Productos directos de posets

Definición

El **producto directo** $(L, \leq_L) \times (M, \leq_M)$ de (L, \leq_L) y (M, \leq_M) tiene como universo a $L \times M$ y como orden parcial a la relación

$$(x_1, y_1) \leq_{L \times M} (x_2, y_2) \iff x_1 \leq_L x_2 \ \& \ y_1 \leq_M y_2.$$

Definimos además $L^1 := L$ y $L^{n+1} := L \times L^n$ para todo poset L . ¿ L^0 ?

Diferencias y similitudes con la multiplicación

	$L \times M \neq M \times L$	$L \times (M \times N) \neq (L \times M) \times N$	
pero sí	$L \times M \cong M \times L$	$L \times (M \times N) \cong (L \times M) \times N$	(iso).

Ejemplo

A las cadenas de 2, 3, 4, ... elementos las denotaremos **2**, **3**, **4**, etc.

$$2 \times 2, \quad 2 \times 3, \quad 2^n \cong \mathcal{P}(\{1, \dots, n\}) \text{ (P7E13a).}$$

Productos directos de retículos

También se pueden hacer productos de estructuras algebraicas.

También se pueden hacer productos de estructuras algebraicas.

Definición

El **producto directo** $(L, \vee_L, \wedge_L) \times (M, \vee_M, \wedge_M)$ de dos retículos tiene como universo a $L \times M$ y operaciones definidas **coordenada a coordenada**:

$$(x_1, y_1) \vee_{L \times M} (x_2, y_2) := (x_1 \vee_L x_2, y_1 \vee_M y_2)$$

$$(x_1, y_1) \wedge_{L \times M} (x_2, y_2) := (x_1 \wedge_L x_2, y_1 \wedge_M y_2)$$

Productos directos de retículos

También se pueden hacer productos de estructuras algebraicas.

Definición

El **producto directo** $(L, \vee_L, \wedge_L) \times (M, \vee_M, \wedge_M)$ de dos retículos tiene como universo a $L \times M$ y operaciones definidas **coordenada a coordenada**:

$$(x_1, y_1) \vee_{L \times M} (x_2, y_2) := (x_1 \vee_L x_2, y_1 \vee_M y_2)$$

$$(x_1, y_1) \wedge_{L \times M} (x_2, y_2) := (x_1 \wedge_L x_2, y_1 \wedge_M y_2)$$

Ejercicio

- 1 (P7E8b) Comprobar que esta definición es coherente con la del producto como posets.



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba



Productos directos de retículos

También se pueden hacer productos de estructuras algebraicas.

Definición

El **producto directo** $(L, \vee_L, \wedge_L) \times (M, \vee_M, \wedge_M)$ de dos retículos tiene como universo a $L \times M$ y operaciones definidas **coordenada a coordenada**:

$$(x_1, y_1) \vee_{L \times M} (x_2, y_2) := (x_1 \vee_L x_2, y_1 \vee_M y_2)$$

$$(x_1, y_1) \wedge_{L \times M} (x_2, y_2) := (x_1 \wedge_L x_2, y_1 \wedge_M y_2)$$

Ejercicio

- 1 (P7E8b) Comprobar que esta definición es coherente con la del producto como posets.
- 2 (*) Definir producto infinito o potencia infinita de estructuras.



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba400
AÑOS

Si tenemos productos... ¿cómo no vamos a tener sumas?

Si tenemos productos... ¿cómo no vamos a tener sumas?

Definición

La **suma directa** $(L, \leq_L) \oplus (M, \leq_M)$ de (L, \leq_L) y (M, \leq_M) **disjuntos** tiene como universo a $L \cup M$ y al orden parcial definido por casos:

$$x \leq_{L \oplus M} y \iff (x, y \in L \ \& \ x \leq_L y) \ \acute{o} \ (x, y \in M \ \& \ x \leq_M y)$$

Si tenemos productos... ¿cómo no vamos a tener sumas?

Definición

La **suma directa** $(L, \leq_L) \oplus (M, \leq_M)$ de (L, \leq_L) y (M, \leq_M) **disjuntos** tiene como universo a $L \cup M$ y al orden parcial definido por casos:

$$x \leq_{L \oplus M} y \iff (x, y \in L \ \& \ x \leq_L y) \ \acute{o} \ (x, y \in M \ \& \ x \leq_M y)$$

(Para estructuras algebraicas es más difícil definir la suma directa).

Si tenemos productos... ¿cómo no vamos a tener sumas?

Definición

La **suma directa** $(L, \leq_L) \oplus (M, \leq_M)$ de (L, \leq_L) y (M, \leq_M) **disjuntos** tiene como universo a $L \cup M$ y al orden parcial definido por casos:

$$x \leq_{L \oplus M} y \iff (x, y \in L \ \& \ x \leq_L y) \ \acute{o} \ (x, y \in M \ \& \ x \leq_M y)$$

(Para estructuras algebraicas es más difícil definir la suma directa).

La suma directa de posets corresponde a poner “uno al lado del otro”, sin relación entre ellos —de hecho, $(\leq_{L \oplus M}) = (\leq_L) \cup (\leq_M)$.

Ejercicios

- Si $D \subseteq L \cup M$ es decreciente en $L \oplus M$, entonces $D \cap L$ es decreciente en L y $D \cap M$ lo es en M .
- Si $D \subseteq L$ es decreciente en L , entonces lo es en $L \oplus M$ (ídem $D \subseteq M$).

Ejercicios

- Si $D \subseteq L \cup M$ es decreciente en $L \oplus M$, entonces $D \cap L$ es decreciente en L y $D \cap M$ lo es en M .
- Si $D \subseteq L$ es decreciente en L , entonces lo es en $L \oplus M$ (ídem $D \subseteq M$).

Teorema

Para todo par de posets L y M , $\mathcal{D}(L \oplus M) \cong \mathcal{D}(L) \times \mathcal{D}(M)$.

Ejercicios

- Si $D \subseteq L \cup M$ es decreciente en $L \oplus M$, entonces $D \cap L$ es decreciente en L y $D \cap M$ lo es en M .
- Si $D \subseteq L$ es decreciente en L , entonces lo es en $L \oplus M$ (ídem $D \subseteq M$).

Teorema

Para todo par de posets L y M , $\mathcal{D}(L \oplus M) \cong \mathcal{D}(L) \times \mathcal{D}(M)$.

Corolario (Caracterización de D_n)

Todo poset de divisores es un producto de cadenas (usa **P7E4b**).

Fin de la Primera Parte

